

# **PTASIA GRYPA**

## **ULOTKA INFORMACYJNA**

### **ZAGROŻENIE WYSOCE ZJADLIWĄ GRYPĄ PTAKÓW**

**PTASIA GRYPA** - zakaźna, zaraźliwa choroba drobiu wywołana przez wirus.  
**ATAKOWANE GATUNKI** - wszystkie gatunki ptaków wolno żyjących i domowych (największe straty wśród kur i indyków).

**ŹRÓDŁA ZAKAŻENIA** - ptaki wolno żyjące, będące bezobjawowymi nosicielami, zwłaszcza migrujące ptaki wodne.

**PODSTAWOWE OBJAWY** - osowiałość, gwałtowny spadek lub utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, obrzęk i zasinienie grzebienia oraz dzwonek, silne łzawienie, kichanie, duszność, obrzęk zatok podczołowych, objawy nerwowe, biegunka, nagłe upadki zwierząt bez widocznych objawów - śmiertelność do 100%.

**ROZPRZESTRZENIANIE CHOROBY** - zakażone ptaki wydają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych.

Ptaki domowe zarażają się przez kontakt bezpośredni z migrującymi ptakami dzikimi nosicielami choroby lub przez kontakt pośredni: na przykład z zakażoną wodą do picia, paszą.

Rozprzestrzenianie choroby może następować również przez sprzęt, środki transportu, człowieka.

**ZAPOBIEGANIE CHOROBI** - zabezpieczenie budynków przed dostępem innych zwierząt niż utrzymywane w gospodarstwie, zaopatrzenie w maty dezynfekcyjne na wypadek wystąpienia zagrożenia epizootycznego, posiadanie środków dezynfekcyjnych w ilości niezbędnej do prowadzenia doraźnej dezynfekcji.

**WRAŻLIWOŚĆ WIRUSA** - wirusa zabija obróbka termiczna, powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne.

### **HODOWCO DROBIU!**

**Chroń swoje ptaki przed kontaktem z ptactwem dzikim zwłaszcza wodnym i drapieżnym.**